

Bula para o Paciente

Vidisic® Gel **Ácido poliacrílico**

Gel estéril para uso oftálmico em tubo plástico contendo 10 g.

Uso pediátrico e adulto

Composição

Cada 1 g de produto contém: 2,0 mg de ácido poliacrílico (carbomer 940).
Outros componentes: cetrimida, sorbitol, edetato dissódico, água purificada.

Ação do medicamento

Vidisic repõe o fluido lacrimal e representa, devido às suas propriedades tixotrópicas, um umidificante da córnea e da conjuntiva, prevenindo, assim, lesões

epiteliais oculares. Vidisic é um medicamento tópico para uso oftálmico, que começa a agir imediatamente após a administração.

Indicações

Substituição do fluido lacrimal na deficiência de produção de lágrimas (olhos ressecados).

Contra-indicações

Hipersensibilidade a um dos componentes da fórmula.

Precauções e Advertências

Produto somente para uso oftálmico.

Gravidez e Lactação: Não existem estudos conclusivos sobre a influência Vidisic na gravidez e amamentação. Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

Interações Medicamentosas

Não são conhecidas no uso indicado (tópico oftálmico). Porém, se outros medicamentos tópicos oftálmicos estiverem sendo utilizados concomitantemente, Vidisic deve ser a última medicação a ser administrada, após um intervalo de 5 minutos.

Não há contra-indicação relativa à faixas etárias.

Informe ao médico o aparecimento de reações indesejáveis.

Modo de uso

Salvo prescrição contrária, aplicar 1 gota de Vidisic no saco conjuntival, de 3 a 5 vezes ao dia, durante o dia e antes de dormir.

Para melhor utilização, segure o tubo na posição vertical, de forma que uma gota de tamanho apropriado se forme e desprenda facilmente do gotejador.

Usuários de lentes de contato devem removê-las antes da instilação, e aguardar 15 minutos antes de recolocá-las.

Vidisic apresenta prazo de validade de 36 meses a partir da data de fabricação.

Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica.

Não use o medicamento com prazo de validade vencido. Antes

de usar, observe o aspecto do medicamento.

Reações Adversas

Mesmo quando administrado conforme a indicação, este produto pode causar turvação transitória da visão, devendo haver cuidado ao dirigir veículos ou operar máquinas.

Superdose

Nenhum caso de superdosagem tem sido relatado para ácido poliacrílico para uso oftálmico.

Cuidados de conservação

Manter Vidisic ao abrigo da luz e da umidade. Conservar em temperatura inferior a 25°C.

Evitar tocar a ponta do frasco contagotas, para reduzir o risco de contaminação do produto.

Não utilizar caso o lacre do frasco não esteja intacto.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance de crianças.

Este medicamento, depois de aberto, somente poderá ser consumido em 28 dias.

Registro ANVISA nº 119610004

Farmacêutico Responsável: Ana Paula Ganzer CRF-RS: 9663

Fabricado por
Dr. Gerhard Mann
Chem. Pharm. Fabrik GmbH
13581 – Berlim – Alemanha

Importado e distribuído por
BL Indústria Ótica Ltda.
R. Dona Alzira, 139
Porto Alegre – RS
CNPJ 27.011.022/0001-03
SAC (Serviço de Atendimento ao
Consumidor) 0800 7026464

Bula Para profissional da Saúde

Vidisic® Gel **Ácido poliacrílico**

Gel estéril para uso oftálmico em tubo plástico contendo 10 g.

Uso pediátrico e adulto

Composição

Cada 1 g de produto contém: 2,0 mg de ácido poliacrílico (carbomer 940).
Outros componentes: cetrimida,

sorbitol, edetato dissódico, água purificada.

Características farmacológicas

Vidisic repõe o fluido lacrimal e representa, devido às suas propriedades tixotrópicas, um umidificante da córnea e da conjuntiva, prevenindo, assim, lesões epiteliais oculares. Vidisic é um medicamento tópico para uso oftálmico, que começa a agir imediatamente após a administração. O efeito farmacológico do ácido poliacrílico é um aumento na viscosidade da base, resultando em um aumento do tempo de adesão e retenção. Vidisic repõe a fase aquosa e mimetiza a camada de mucina.

Indicações

Substituição do fluido lacrimal na deficiência de produção de lágrimas (olhos ressecados).

Contra-indicação

Hipersensibilidade a um dos componentes da fórmula.

Modo de uso e cuidados de conservação

Manter Vidisic ao abrigo da luz e da umidade. Conservar em temperatura inferior a 25°C.

Evitar tocar a ponta do frasco contagotas, para reduzir o risco de contaminação do produto.

Este medicamento, depois de aberto, somente poderá ser consumido em 28 dias.

Posologia

Salvo prescrição contrária, aplicar 1 gota de Vidisic no saco conjuntival, de 3 a 5 vezes ao dia, durante o dia e antes de dormir.

Advertências

Produto exclusivo para uso oftálmico. Os usuários de lentes de contato devem remover as lentes antes da aplicação do produto, e aguardar 15 minutos antes de recolocá-las.

Não há contra-indicação relativa a faixas etárias.

Interações Medicamentosas

Não são conhecidas no uso indicado (tópico oftálmico). Porém, se outros medicamentos tópicos oftálmicos estiverem sendo utilizados concomitantemente, Vidisic deve ser

a última medicação a ser administrada, após um intervalo de 5 minutos.

Reações adversas

Mesmo quando administrado conforme a indicação, este produto pode causar turvação transitória da visão, devendo haver cuidado ao dirigir veículos ou operar máquinas.

Superdose

Nenhum caso de superdosagem tem sido relatado para ácido poliacrílico para uso oftálmico.

Registro ANVISA nº 119610004

Farmacêutico Responsável: Ana Paula Ganzer CRF-RS: 9663

Fabricado por
Dr. Gerhard Mann
Chem. Pharm. Fabrik GmbH
13581 – Berlim – Alemanha

Importado e distribuído por
BL Indústria Ótica Ltda.
R. Dona Alzira, 139
Porto Alegre – RS
CNPJ 27.011.022/0001-03
SAC (Serviço de Atendimento ao
Consumidor) 0800 7026464